

CAM-S DELIRIUM SEVERITY SCORING

(แบบประเมินความรุนแรงของภาวะสับสนเฉียบพลัน CAM-S ฉบับภาษาไทย)

แบบประเมิน CAM สามารถใช้ในการตัดสินใจร่วมกับแบบประเมินความรุนแรงของภาวะสับสนเฉียบพลัน

ทั้ง CAM-S ฉบับยาว และ CAM-S ฉบับสั้น

ลักษณะของผู้ป่วย	คะแนนของความรุนแรง		
การให้คะแนน CAM-S: ประเมินแต่ละอาการของภาวะสับสนเฉียบพลันที่ปรากฏใน CAM ดังนี้ ไม่พบ (0), พบเล็กน้อย (1), พบมาก (2) ในกรณีของคำถาม อาการเกิดขึ้นเฉียบพลันหรืออาการขึ้นๆลงๆ ให้ประเมินเป็น ไม่พบ (0) หรือ พบ (1) รวมคะแนนเหล่านี้ออกมาเป็นคะแนนรวม คะแนนที่สูงกว่าบ่งบอกถึงความรุนแรงของภาวะสับสนเฉียบพลันที่มากกว่า			
	ไม่พบ	พบ (เล็กน้อย)	พบ (มาก)
1. อาการเกิดขึ้นเฉียบพลันและ อาการขึ้นๆ ลงๆ (Acute onset & Fluctuating course)	0	1	
2. ขาดสมาธิ (Inattention)	0	1	2
3. ความคิดไม่เป็นระบบ (Disorganized thinking)	0	1	2
4. ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนไป (Altered level of consciousness)	0	ไวต่อการกระตุ้น/ เชื่องซึม: 1	ซึ่มปลุกตื่นยาก/โคม่า: 2
5. สับสนต่อสภาวะแวดล้อม (Disorientation)	0	1	2
6. ความจำบกพร่อง (Memory impairment)	0	1	2
7. การรับรู้ผิดปกติ (Perceptual disturbance)	0	1	2
8. พฤติกรรมอารมณ์กระสับกระส่าย (Psychomotor agitation)	0	1	2
9. พฤติกรรมอารมณ์เฉื่อยชา (Psychomotor retardation)	0	1	2
10. วงจรการหลับตื่นเปลี่ยนไป (Altered sleep-wake cycle)	0	1	2
ฉบับสั้น คะแนนความรุนแรง:	รวมคะแนนที่ได้จากแถวที่ 1-4 โดยคะแนนจะอยู่ในช่วง 0-7 คะแนน		
ฉบับยาว คะแนนความรุนแรง:	รวมคะแนนที่ได้จากแถวที่ 1-10 โดยคะแนนจะอยู่ในช่วง 0-19 คะแนน		

Confusion Assessment Method. Copyright 2003, Hospital Elder Life Program, LLC. ห้ามทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

AGS หรือ Hospital Elder Life Program, LLC ไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บและ/หรือความเสียหายที่เกิดกับบุคคลหรือทรัพย์สิน เนื่องมาจากการใช้เครื่องมือใน help.agscocare.org

เครื่องมือนี้ได้รับอนุญาตจาก American Geriatrics Society, 2021

(Thai version: ธัญชนก จัดตาริส และ ไอศวรรย์ เพชรหล่อเหลียน)